



Grandes Cultures



D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la
Protection des Végé-
taux
93, rue de Curambourg
45404 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
srpv-centre@terre-net.fr

Imprimé à la Station
d'Avertissements agrico-
les de la Région CENTRE
La Directrice-Gérante :
M. HANRION
Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 80530
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collabora-
tion avec la FREDEC
CENTRE (Art L252-1 à
L252-5 du Code Rural)

AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

Bulletin technique n° 31 du 27/09/2001 - 2 pages

Colza

Stades : "6-7 feuilles" pour les plus avan-
cés à "cotylédons" ; croissance lente
(températures fraîches).

Ravageurs

- Les pluies de ces derniers jours sont
favorables aux **limaces**.

**Continuer la surveillance jusqu'à "4-5
feuilles"**.

- Les dégâts de **petites altises** ne sont
plus préjudiciables au-delà du stade "2
feuilles" ; leurs attaques sont encore impor-
tantes dans quelques parcelles (Reugny -
37-), principalement sur les bordures.

- Quelques **grosses altises** ont été cap-
turées (Treilles -45-, Villefrancoeur, Aver-
don -41-, Chaveignes, Chambourg
-37-) ; le temps frais et humide n'était pas
favorable à un vol important.

A surveiller en cas de temps ensoleillé.

- Les captures de **tenthredes** ont dimi-
nué ; les larves commencent à être obser-
vées (Autrèche-37-).

A surveiller.

- Des dégâts de **noctuelles défoliatrices
et terricoles** sont signalés dans l'Indre.
Ce sont de grosses chenilles de couleur
terreuse. Elles sont généralement actives
la nuit ; le jour, elles se dissimulent sous les
pierres et les mottes de terre. Elles s'en-
roulent quand on les saisit.

**Surveiller les parcelles ; en cas de
dégâts et de présence de larves, une
intervention peut être nécessaire. plu-
sieurs produits sont homologués pour
cet usage. Traiter de préférence le soir
avec un volume d'eau important (250 l/
ha).**

- Les **pucerons** sont présents de façon
vraiment anecdotique : quelques individus
aptères (sans ailes), isolés, à Auzouer
(37), Poilly lez Gien (45).

Pas de risque pour le moment. A suivre.

- Aucune capture de **charançon du bour-
geon terminal** : à rechercher dans les
cuvettes dès les premiers réchauffements
(temps sec et ensoleillé). Attention, tout
charançon piégé en cuvette à cette épo-
que n'est pas forcément un charançon du
bourgeon terminal ; pensez à vérifier :

- la taille : 2,5 à 3,7 mm ;

- la couleur de l'insecte : noir brillant ;
- la couleur de l'extrémité des **pattes** :
rousse ;

- la présence de taches : tache blanchâtre
sur le dos, **tache rousse sur les flancs**.

Maladies

- Suivi Phoma

Au champ

Comme tous les ans, on observe quelques
macules sur feuilles et cotylédons.

Suivi des projections d'ascospores

Pour les pièges passifs, le premier pic
important a été observé sur le site de
Fleury les Aubrais (45). Toutefois, le ris-
que semble actuellement moins important
qu'à l'automne 1999 (voir graphes page
suivante).

Maturation des périthèces

La maturation est plus avancée dans le
Cher qu'en Indre et dans le Loiret.

Conclusion

Nous entrons dans une période à risque
pour le phoma : rappelons que la lutte
contre cette maladie passe avant tout par
des mesures agronomiques (choix de
variétés peu sensible, semis précoce,
enfouissement des résidus, diversifica-
tion de l'assolement). **L'intervention fon-
gicide doit être réservée aux parcelles
à risque** (voir bulletin précédent).

**En cas de maintien d'un temps pluvieux,
une intervention pourrait être néces-
saire d'ici peu (semaine prochaine) dans
les parcelles à risque. A suivre.**

- Autres maladies

Mildiou : symptômes assez fréquents.

Pas d'intervention.

Pour info

- **Colza** : quelques parcelles envahies par
les géraniums.

- **Tournesol** : les premiers résultats de
récolte sont médiocres.

- Céréales :

.de rares parcelles ont déjà été semées,
première vague de **semis** prévue en début
de semaine prochaine ;

.lors de nos récentes observations dans le
maïs (recherche de pyrales), nous avons
vu qu'il y avait **peu de pucerons** ; à suivre
sur les céréales dès la levée.

Colza

- Suivi phoma :

premier pic
important sur le
piège passif de
Fleury

- Dégâts de
noctuelles dans
quelques parcelles

Céréales

Avant semis,
penser à mettre
des pièges pour
connaître
l'importance des
populations de
limaces

P 309

0340 50 43155

Suivi des projections d'ascospores avec capteur dynamique à Rosières (18)

